

حاملگی خارج از رحم:

به جایگزینی تخمک بارور شده در محل‌هایی غیر از رحم، از قبیل تخمدانها، گردن رحم، در شکم، لوله های رحمی و ... را حاملگی خارج از رحم گویند. که از مهمترین شرایط اورژانسی در حاملگی ها می باشد و باید این نوع حاملگی هر چه سریعتر تشخیص داده شود. چون این نوع بارداری نابجاست و جنین قابل نگه داشتن نیست و بایستی از رشد و بزرگ شدن آن جلوگیری کرد و باعث نجات جان مادر و حفظ بارداری مجدد شد.



علائم:

در ابتدا مادر مانند دیگر حاملگی های طبیعی دچار تاخیر و اختلال در قاعدگی، حساس شدن پستانها، تهوع و استفراغ و بدنبال آن دچار درد لگنی، شکمی و لکه بینی و خونریزی می شود. بعد از آن ممکن است فرد دچار سرگیجه، غش و افت فشارخون به علت خونریزی غیر طبیعی شود. در صورت بروز این علائم بایستی سریعاً به پزشک مراجعه شود. چون لوله های رحمی دارای دیواره بسیار نازک هستند و با رشد چنین امکان پاره شدن لوله ها بسیار زیاد است. در نتیجه خونریزی شدید در ناحیه شکم رخ می دهد و فرد دچار غش می شود.

علل حاملگی خارج از رحم:

تاکنون علت حاملگی خارج از رحم بطور کامل مشخص نشده است اما شایعترین علت این نوع حاملگی عبارتند است از: تنگی، انسداد و یا چسبندگی در لوله ها، اختلال مادرزادی در لوله های رحم، استفاده از IUD، عفونتهای لگنی، حاملگی خارج از رحم قبلی، آسیب های لوله ای بر اثر اعمال جراحی، مشکل دیواره های لوله رحمی که نتواند منقبض شود و تخمک را به داخل رحم به حرکت در آورد.

درمان:

- با مراجعه به پزشک، و دستور انجام سونوگرافی که آیا حاملگی در داخل رحم یا در جای غیر از رحم است.
- چک هورمون BHCG که نشان دهنده حاملگی است. این هورمون در اوایل حاملگی هر ۲ روز دو برابر می شود اما در

حاملگی خارج از رحم

ویژه آموزش به بیمار

تهیه کننده:

زهرا رحمانی سرپرستار اتاق عمل

تایید کننده

دکتر فرخ خانی جراح زنان و زایمان

منابع:

بیماریهای زنان برک و نواک ۲۰۱۸

1404

این آمپول از رشد جنین در درون لوله ها جلوگیری می کند اما بایستی فرد تحت نظر باشد.

درمان جراحی:

در مواردی که اندازه تخمک بارور شده بزرگ باشد و به درمان دارویی جواب ندهد و همچنین هموگلوبین بیمار رو به کاهش باشد نشان دهنده پاره شدن لوله ها است که برای بیمار بسیار خطرناک است و برای نجات جان مادر بایستی به اتاق عمل برود.

جراحی به روش لاپاراسکوپی، و در موارد اورژانس و تهدید کننده حیات به روش لاپاراتومی یا باز انجام می شود.

حاملگی های شکمی و لوله ای این هورمون کاهش می یابد.

- کاهش هموگلوبین خون که می تواند نشان دهنده خونریزی داخل شکمی باشد که بسیار خطرناک است.
- در صورتیکه دچار دردی هستید که به شانه و گردن انتشار پیدا می کند و یا لکه بینی، عرق سرد، نبض تند، سرگیجه، خونریزی و کاهش فشارخون سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

درمان دارویی:

در بعضی مواقع که سائز جنین خارج از رحم کوچک باشد یا جذب می شود و یا دفع. اما بعضی مواقع با چک تیتتر حاملگی پزشک متوجه می شود که سائز جنین رو به رشد است پس دستور تزریق آمپولی بنام متوتروکسات را می دهد که